

# Erratum zur Dualen Reihe Gynäkologie

S. 508:

**aktueller Text:**

Unter amnioskopischer Sicht oder mittels SpekulumEinstellung wird nach sorgfältiger Desinfektion und Hyperämisierung durch flüssigen Stickstoff der fetale Skalp bis zum Austritt von Kapillarblut angeritzt.

**neuer Text:**

Unter amnioskopischer Sicht oder mittels SpekulumEinstellung wird nach sorgfältiger Desinfektion und Hyperämisierung, z.B. mit **Chlorethyl-Spray**, der fetale Skalp bis zum Austritt von Kapillarblut angeritzt.

S. 508, Abb. E-3.34, Legendentext:

**aktueller Text:**

Unter amnioskopischer Sicht wird nach sorgfältiger Desinfektion und Hyperämisierung durch flüssigen Stickstoff die Haut angeritzt und das Blut in einer heparinisierten Glaskapillare aufgefangen.

**neuer Text:**

**Unter SpekulumEinstellung (wie hier abgebildet) oder** unter amnioskopischer Sicht wird nach Desinfektion und Hyperämisierung, z.B. mit **Chlorethyl-Spray**, die Haut angeritzt und das Blut in einer heparinisierten Glaskapillare aufgefangen.

Du hast einen Fehler gefunden, der noch nicht im Erratum steht oder möchtest uns Anregungen geben, was wir verbessern können? Wir freuen uns über jedes einzelne Feedback, das bei uns eingeht. Schreibe doch einfach eine Email an:

<https://www.thieme.de/de/thieme-gruppe/kontaktformular-15211.htm>

„Einen Fehler machen und ihn nicht korrigieren - das erst heißt wirklich einen Fehler machen.“  
(Konfuzius)