

# Sachverzeichnis

## A

Akute Verwirrtheit 343  
Akuter Schmerz 647  
Akutes Substanzentzugssyndrom 509  
Ausgeprägte Einsamkeit 667

## B

Beeinträchtigte emanzipierte Entscheidungsfindung 379  
Beeinträchtigte Entscheidungsfindung 376  
Beeinträchtigte Familienprozesse 424  
Beeinträchtigte gastrointestinale Motilität 238  
Beeinträchtigte Gedächtnisleistung 373  
Beeinträchtigte Gehfähigkeit 285  
Beeinträchtigte Harnausscheidung 221  
Beeinträchtigte Immunreaktion 529  
Beeinträchtigte Integrität der Haut 574  
Beeinträchtigte Integrität der Mundschleimhaut 584  
Beeinträchtigte Integrität des Gewebes 568  
Beeinträchtigte Integrität des Mamillen-Areola-Komplexes 581  
Beeinträchtigte intestinale Ausscheidung 242  
Beeinträchtigte Mobilität im Bett 273  
Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl 275  
Beeinträchtigte neurologische Entwicklung des Säuglings 685  
Beeinträchtigte physische Mobilität 268  
Beeinträchtigte postoperative Erholung 297  
Beeinträchtigte Religiosität 525  
Beeinträchtigte Resilienz 480  
Beeinträchtigte sexuelle Funktion 448  
Beeinträchtigte Sitzfähigkeit 278  
Beeinträchtigte soziale Interaktion 437  
Beeinträchtigte Spontanatmung 316  
Beeinträchtigte Stehfähigkeit 280  
Beeinträchtigte Stimmungsregulation 505  
Beeinträchtigte Stuhlkontinenz 251  
Beeinträchtigte Transferfähigkeit 282  
Beeinträchtigte verbale Kommunikation 382  
Beeinträchtigtiger Gasaustausch 254  
Beeinträchtigtger physischer Comfort 643  
Beeinträchtigtger psychologischer Comfort 672  
Beeinträchtigtges Erziehungsverhalten 411  
Beeinträchtigtges Schlucken 203  
Beeinträchtigtges spirituelles Wohlbefinden 519  
Beeinträchtigtges Weaning beim Erwachsenen 320  
Beeinträchtigtges Weaning beim Kind 319  
Behinderungsassoziierte Harninkontinenz 224  
Bereitschaft für ein gesünderes Altern werden 164

Bereitschaft für ein verbessertes Coping 462  
Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung 158  
Bereitschaft für ein verbessertes Erziehungsverhalten 417  
Bereitschaft für ein verbessertes familiäres Coping 466  
Bereitschaft für ein verbessertes gemeinschaftliches Coping 471  
Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement 105  
Bereitschaft für ein verbessertes Gewichts-Selbstmanagement 136  
Bereitschaft für ein verbessertes Schlafmuster 264  
Bereitschaft für ein verbessertes Selbstkonzept 388  
Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden 524  
Bereitschaft für ein verbessertes Trauern 480  
Bereitschaft für eine verbesserte emanzipierte Entscheidungsfindung 381  
Bereitschaft für eine verbesserte Entscheidungsfindung 378  
Bereitschaft für eine verbesserte Gesundheitskompetenz 163  
Bereitschaft für eine verbesserte Nährstoffzufuhr 178  
Bereitschaft für eine verbesserte neurologische Entwicklung des Säuglings 689  
Bereitschaft für eine verbesserte Religiosität 528  
Bereitschaft für eine verbesserte Resilienz 486  
Bereitschaft für eine verbesserte verbale Kommunikation 386  
Bereitschaft für einen verbesserten Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf 445  
Bereitschaft für verbesserte Familienprozesse 426  
Bereitschaft für verbesserte Gesundheitskenntnisse 371  
Bereitschaft für verbesserte Hoffnung 488  
Bereitschaft für verbesserte intime Partnerbeziehung 436  
Bereitschaft für verbesserte Selbstversorgungsfähigkeiten 323  
Bereitschaft für verbesserte Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung 156  
Bereitschaft für verbesserten physischen Comfort 645  
Bereitschaft für verbesserten psychologischen Comfort 674  
Bereitschaft für verbesserten sozialen Comfort 661  
Bereitschaft für verbessertes Stillen 191  
Bereitschaft zur Stärkung der sozialen Identität von Transgender-Personen 396

## C

Chronisch unzureichendes Selbstwertgefühl 397  
Chronische funktionelle Obstipation 246  
Chronische Verwirrtheit 352  
Chronischer Schmerz 655  
Chronisches Schmerzsyndrom 651

## D

Drangharninkontinenz 233  
Druckschädigung bei einem Erwachsenen 559  
Druckschädigung beim Kind 551  
Druckschädigung beim Säugling 545

## F

Fehlangepasstes Coping 460  
Fehlangepasstes familiäres Coping 463  
Fehlangepasstes gemeinschaftliches Coping 468  
Fehlangepasstes Trauern 477  
Frailty-Syndrom beim älteren Menschen 165

## G

Geburtsschmerz 660  
Gestörte Denkprozesse 363  
Gestörte persönliche Identität 389  
Gestörtes Körperbild 407

## H

Hyperthermie 640

## I

Ineffektive Atemwegsclearance 597  
Ineffektive Emotionsregulation 501  
Ineffektive Erfüllung einer Rolle 430  
Ineffektive Ernährungsweise des Kindes 199  
Ineffektive Ernährungsweise von Jugendlichen 201  
Ineffektive Ernährungsweise von Säuglingen 197  
Ineffektive Impulskontrolle 358  
Ineffektive intime Partnerbeziehung 433  
Ineffektive periphere Gewebep erfusion 308  
Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings 690  
Ineffektive Thermoregulation 632  
Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung 152  
Ineffektive Verhaltensweisen der Mundhygiene 340  
Ineffektive Verhaltensweisen der Schlafhygiene 265  
Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit 147  
Ineffektiver Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf 440  
Ineffektives Atemmuster 311

Ineffektives Fatigue-Selbstmanagement 124  
Ineffektives Gesundheitsmanagement der Familie 106  
Ineffektives Gesundheitsmanagement der Gemeinschaft 111  
Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement 97  
Ineffektives Lymphödem-Selbstmanagement 128  
Ineffektives Nausea-Selbstmanagement 131  
Ineffektives Schlafmuster 258  
Ineffektives Schmerz-Selbstmanagement 134  
Ineffektives Selbstmanagement der Augentrockenheit 119  
Ineffektives Selbstmanagement der Mundtrockenheit 120  
Ineffektives Selbstmanagement des Übergewichts 137  
Ineffektives Selbstmanagement des Untergewichts 142  
Ineffektives Stillen 182

## K

Kontamination 625

## M

Mischharninkontinenz 227  
Moralischer Distress 517

## N

Neonatale Hyperbilirubinämie 208  
Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten 619

## P

Posttraumatisches Syndrom 453

## R

Risiko der Hyperthermie 642  
Risiko der Unterbrechung des ausschließlichen Stillens 189  
Risiko einer akuten Verwirrtheit 348  
Risiko einer beeinträchtigten Flüssigkeitsbilanz 212  
Risiko einer beeinträchtigten Menschenwürde 395  
Risiko einer gegen andere Personen gerichteten Gewalttätigkeit 614  
Risiko einer gestörten Immigrationstransition 458  
Risiko einer ineffektiven zerebralen Gewebep erfusion 307  
Risiko einer unzureichenden Gesundheitskompetenz 161  
Risiko einer verminderten neonatalen Körpertemperatur 636  
Risiko einer verzögerten Entwicklung des Kindes 680  
Risiko eines beeinträchtigten Wasser-Elektrolyt-Haushalts 211  
Risiko eines chronisch unzureichenden Selbstwertgefühls 399

- Risiko eines ineffektiven Schlafmusters 262  
 Risiko eines situativ unzureichenden Selbstwertgefühls 402  
 Risiko für allergische Reaktion 630  
 Risiko für allergische Reaktion auf Latex 631  
 Risiko für Aspiration 595  
 Risiko für Augentrockenheit 543  
 Risiko für autonome Dysreflexie 500  
 Risiko für beeinträchtigte emanzipierte Entscheidungsfindung 380  
 Risiko für beeinträchtigte gastrointestinale Motilität 241  
 Risiko für beeinträchtigte Integrität der Haut 578  
 Risiko für beeinträchtigte Integrität der Mundschleimhaut 587  
 Risiko für beeinträchtigte Integrität des Gewebes 572  
 Risiko für beeinträchtigte Integrität des Mamillen-Areola-Komplexes 583  
 Risiko für beeinträchtigte intestinale Ausscheidung 245  
 Risiko für beeinträchtigte kardiovaskuläre Funktion 301  
 Risiko für beeinträchtigte periphere neurovaskuläre Funktion 608  
 Risiko für beeinträchtigte physische Mobilität 272  
 Risiko für beeinträchtigte postoperative Erholung 300  
 Risiko für beeinträchtigte Religiosität 526  
 Risiko für beeinträchtigte Resilienz 484  
 Risiko für beeinträchtigte Stuhlkontinenz 253  
 Risiko für beeinträchtigte verbale Kommunikation 385  
 Risiko für beeinträchtigtetes Erziehungsverhalten 414  
 Risiko für beeinträchtigtetes spirituelles Wohlbefinden 522  
 Risiko für berufsbedingte Krankheit 628  
 Risiko für berufsbedingte physische Verletzungen 629  
 Risiko für Brandverletzungen 540  
 Risiko für chirurgische Wundinfektion 537  
 Risiko für chronische funktionelle Obstipation 248  
 Risiko für das Absinken der perioperativen Körpertemperatur 639  
 Risiko für das Syndrom der verminderten Selbstversorgungsfähigkeit 322  
 Risiko für das Syndrom einer gestörten Familienidentität 394  
 Risiko für Drangharninkontinenz 236  
 Risiko für Druckschädigung beim Erwachsenen 564  
 Risiko für Druckschädigung beim Kind 555  
 Risiko für Druckschädigung beim Säugling 548  
 Risiko für ein akutes Substanzentzugssyndrom 512  
 Risiko für ein gestörtes Bindungsverhalten 428  
 Risiko für ein posttraumatisches Syndrom 457  
 Risiko für eine beeinträchtigte Mutter-Fötus-Dyade 450  
 Risiko für eine beeinträchtigte neurologische Entwicklung des Säuglings 687  
 Risiko für eine Verletzung der Cornea 542  
 Risiko für Erstickungsunfälle 600  
 Risiko für fehlangepasstes Trauern 478  
 Risiko für Frailty-Syndrom beim älteren Menschen 171  
 Risiko für gestörte familiäre Interaktionsmuster 423  
 Risiko für Harnretention 224  
 Risiko für Harnwegsverletzung 567  
 Risiko für ineffektive intime Partnerbeziehung 435  
 Risiko für ineffektive periphere Gewebepfusion 310  
 Risiko für ineffektive Thermoregulation 633  
 Risiko für ineffektive Verhaltensweisen der Mundhygiene 342  
 Risiko für ineffektiven Verhaltensweisen der Schlafhygiene 266  
 Risiko für ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit 150  
 Risiko für ineffektiven Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf 443  
 Risiko für ineffektives Gesundheitsmanagement der Familie 109  
 Risiko für ineffektives Gesundheitsmanagement der Gemeinschaft 113  
 Risiko für ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement 104  
 Risiko für ineffektives Lymphödem-Selbstmanagement 130  
 Risiko für ineffektives Selbstmanagement der Mundtrockenheit 122  
 Risiko für ineffektives Selbstmanagement des Blutzuckerprofils 115  
 Risiko für ineffektives Selbstmanagement des Übergewichts 140  
 Risiko für ineffektives Selbstmanagement des Untergewichts 145  
 Risiko für ineffektives Stillen 186  
 Risiko für Infektion 533  
 Risiko für Kälteschädigung 541  
 Risiko für Kontamination 627  
 Risiko für neonatale Hyperbilirubinämie 210  
 Risiko für nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten 622  
 Risiko für perioperative Positionierungsschädigung 544  
 Risiko für physische Verletzung 540  
 Risiko für plötzlichen Kindstod 610  
 Risiko für Schock 604  
 Risiko für schwankenden Blutdruck 303  
 Risiko für Stürze beim Erwachsenen 591  
 Risiko für Stürze beim Kind 589  
 Risiko für suizidales selbstverletzendes Verhalten 616  
 Risiko für Thrombose 606  
 Risiko für übermäßige Belastung durch den pflegerischen Versorgungsaufwand 475  
 Risiko für übermäßige Blutungen 602  
 Risiko für übermäßige Einsamkeit 669  
 Risiko für übermäßiges Flüssigkeitsvolumen 217  
 Risiko für übermäßiges sitzendes Verhalten 93  
 Risiko für unzureichende Nährstoffzufuhr 176  
 Risiko für unzureichende Produktion von Humanmilch 196  
 Risiko für unzureichende Protein-Energie-Nahrungszufuhr 181  
 Risiko für unzureichendes Flüssigkeitsvolumen 219  
 Risiko für Vergiftungsunfälle 628  
 Risiko für verminderte Aktivitätstoleranz 291  
 Risiko für verminderte Herzleistung 305  
 Risiko für verminderte Körpertemperatur 638  
 Risiko für vermindertes Engagement in ablenkenden Aktivitäten 87  
 Risiko für verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings 684  
 Risiko für verzögertes Wachstum des Kindes 676  
 Risiko für Weglaufversuche 611  
 Risiko für weibliche Genitalverstümmelung 615  
 Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung 155
- S**  
 Situativ unzureichendes Selbstwertgefühl 400  
 Stressharninkontinenz 230  
 Syndrom der verminderten Selbstversorgungsfähigkeit 322  
 Syndrom des beeinträchtigten End-of-Life Comforts 645  
 Syndrom einer gestörten Familienidentität 393
- U**  
 Übermäßige Angst 490  
 Übermäßige Belastung durch Fatigue 293  
 Übermäßige Belastung durch pflegerischen Versorgungsaufwand 472  
 Übermäßige Furcht 497  
 Übermäßige Todesangst 493  
 Übermäßiger elterlicher Rollenkonflikt 419  
 Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen 214  
 Übermäßiges sitzendes Verhalten 91  
 Unausgeglichenes Energiefeld 94  
 Unterbrechung des ausschließlichen Stillens 187  
 Unterbrochene familiäre Interaktionsmuster 421  
 Unzureichende gesundheitliche Selbstwirksamkeit 405  
 Unzureichende Gesundheitskompetenz 159  
 Unzureichende Nährstoffzufuhr 173  
 Unzureichende Produktion von Humanmilch 192  
 Unzureichende Protein-Energie-Nahrungszufuhr 179  
 Unzureichende soziale Bindungen 662  
 Unzureichendes Flüssigkeitsvolumen 217  
 Unzureichendes Gesundheitswissen 368  
 Unzureichendes Selbstmitgefühl 489  
 Unzureichendes soziales Unterstützungsnetzwerk 666
- V**  
 Verminderte Aktivitätstoleranz 288  
 Verminderte Fähigkeiten zum Essen und Trinken 331  
 Verminderte Fähigkeiten zum Sich-Kleiden 329  
 Verminderte Fähigkeiten zum Sich-Waschen 325  
 Verminderte Fähigkeiten zur Körperhygiene 336  
 Verminderte Fähigkeiten zur Toilettenbenutzung 338  
 Verminderte Körpertemperatur 637  
 Verminderte neonatale Körpertemperatur 634  
 Vermindertes Engagement in ablenkenden Aktivitäten 83  
 Verzögerte Entwicklung des Kindes 677  
 Verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings 683  
 Verzögertes Wachstum des Kindes 675