

10.3 Atemwegserkrankungen

10.3.1 Pollinosis

Im Anfall

- Allergiepunkt (78) mit anschließendem Mikroaderlass
- Thymuspunkt
- Ganglion cervicale superius und/oder medius
- ACTH-Punkt oder Shen Men (55)
- Auge (8)
- Innere Nase (16)
- Interferonpunkt
- Vegetativpunkt I (51) oder II (34)
- Omegahaupt- oder Omega-I-Punkt
- Polster (29)
- Lunge (101)
- Niere (95)
- PT 1

Die Behandlung erfolgt alle 2–3 Tage, nach Besserung Übergang zum prophylaktischen Vorgehen (1–2-mal pro Woche).

Zur Prävention/Im Intervall

Die Behandlungsserie umfasst 10–15 Sitzungen, anfangs 4–6 Sitzungen 2-mal pro Woche, dann im Abstand von 1 Woche.

Die erste Behandlung liegt ca. 5–6 Wochen vor Saisonbeginn.

1. Primärer therapeutischer Zugang

- Allergiepunkt (78, ohne Mikroaderlass)
- Thymuspunkt
- Interferonpunkt
- Innere Nase (16)
- ACTH-Punkt (bei „Heufieber“)

2. Ergänzungspunkte

Je nach Anamnese und Belastungsfaktoren:

- Vegetativpunkt I (51) oder Vegetativpunkt II (34)
- Omegahaupt- oder Omega-I-Punkt
- Polster (29)
- Lunge (101)
- Niere (95)
- PT 1

Kombination mit der Körperakupunktur

- Nahpunkte: Di 20, Bl 1, Bl 2, Di 20, 3E 23, Gb 1, Extra 1 (Yintang), Extra 2 (Taiyang)
- Fernpunkte: Mi 6, Mi 10, Le 3, Di 4, Di 11, Gb 20, Gb 37

Zum Beispiel: Prävention

1. Sitzung

- Innere Nase (16)
- Auge (8)
- Ganglion cervicale superius und/oder medius
- Allergiepunkt (78)

2. Sitzung

- Interferonpunkt
- Thymuspunkt
- Vegetativpunkt I (51)
- PT 1

3. Sitzung

- Allergiepunkt (78)
- Interferonpunkt
- Thymuspunkt
- Lunge (101)
- Polster (29)

4. Sitzung

wie 2. Sitzung




Abb. 10.10 Pool Pollinosis.